

**Dronspot 30 mg/7,5 mg roztwór do nakrapiania dla małych kotów**  
**Dronspot 60 mg/15 mg roztwór do nakrapiania dla średnich kotów**  
**Dronspot 96 mg/24 mg roztwór do nakrapiania dla dużych kotów**

**prazykwantel/emodepsyd**

**Podmiot odpowiedzialny**

Bayer Animal Health GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 Leverkusen, Niemcy

**Zawartość substancji czynnych i innych substancji**

Każda pipetka 0,35 ml / 0,70 ml / 1,12 ml zawiera odpowiednio:

**Substancje czynne:** Prazykwantel 30 mg / 60 mg / 96 mg, Emodepsyd 7,5 mg / 15 mg / 24 mg,

**Substancje pomocnicze:** Butylohydroksyanizol (E320) 1,89 mg / 3,78 mg / 6,05 mg

**Wskazania lecznicze**

Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów spowodowanych przez następujące gatunki robaków obłych i robaków płaskich:

Robaki obłe (nicienie)

*Toxocara cati* (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3)

*Toxocara cati* (stadia larwalne L3) – leczenie kotek w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo

*Toxascaris leonina* (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4)

*Ancylostoma tubaeforme* (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4)

Robaki płaskie (tasiemce)

*Dipylidium caninum* (postaci dojrzałe i niedojrzałe)

*Taenia taeniaeformis* (postaci dojrzałe)

*Echinococcus multilocularis* (postaci dojrzałe)

**Przeciwwskazania**

Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia lub ważących poniżej 0,5 kg.

Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

**Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.**