



## PODSTAWOWA OCHRONA

Frontline Spot-on to zaufana miesięczna kontrola przeciw głównym pasożytom zewnętrznym.

### NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Frontline Spot-on 50 mg/0,5 ml roztwór do nakrapiania dla kotów. Frontline Spot-on S 67 mg/0,67 ml roztwór do nakrapiania dla psów. Frontline Spot-on M 134 mg/1,34 ml roztwór do nakrapiania dla psów. Frontline Spot-on L 268 mg/2,68 ml roztwór do nakrapiania dla psów. Frontline Spot-on XL 402 g/4,02 ml roztwór do nakrapiania dla psów.

### POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania. Przezroczysty roztwór.

### SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Substancja czynna: 1 pipeta (0,5ml) zawiera: Fipronil 50mg; 1 pipeta (0,67ml) zawiera: Fipronil 67mg; 1 pipeta (1,34ml) zawiera: Fipronil 134mg; 1 pipeta (2,68 ml) zawiera: Fipronil 268mg; 1 pipeta (4,02 ml) zawiera: Fipronil 402mg.

### WSKAZANIA

Do stosowania leczniczego i zapobiegawczego u kotów oraz psów opadniętych przez: pchły (*Ctenocephalides sp.*), kleszcze (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor sp.*, *Amblyomma americanum*, *Haemaphysalis leachi*, *Ixodes sp.* – w tym przenoszący krętki wywołujące boreliozę.), wszoły (*Felicola subrostratus*, *Trichodectes canis*). Preparat może być wykorzystywany u kotów oraz psów do zapobiegania i leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). W tym celu zaleca się comiesięczny zabieg na pacjencie z objawami alergii oraz na innych psach i kotach z nim przebywających. Pojedyncza dawka preparatu zapewnia ochronę: przed inwazją pchłami przez okres: 3 miesiące u psów i 5 tygodni u kotów, przed inwazją kleszczami przez okres: 3-5 tygodni u psów i 3-4 tygodni u kotów, przed inwazją wszołów przez okres: do 63 dni u psów i 42 dni u kotów.

### PRZECIWSKAZANIA

Nie należy stosować preparatu u szceniąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub o masie ciała poniżej 2 kg oraz u kociąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub masie ciała poniżej 1 kg. Nie stosować u kotów i psów chorych (choroby układowe, stany gorączkowe) lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików, u których preparat może wywoływać objawy niepożądane a nawet prowadzić do śmierci. Nie stosować u gatunków innych niż docelowe. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

### NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCJA

### ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel. 22 699 06 99, fax 22 699 06 98

### PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC

### DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Lipiec 2016

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.